

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: JN-07/55/00655-14/2017
Ügyintéző: Vincze Katalin
Telefon: 06/20-434-7679

Tárgy: károsító helyzet-jelentés
Hiv. szám:
Melléklet: -

**Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép
2017. 09. 15. - 2017. 09. 30. között**

Időjárás: Szeptember második dekádjában folytatódott az őszi időjárás. A nappali legmagasabb hőmérséklet 25 °C körül alakult, míg az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 10 °C körül alakult. Az esti lehülések következtében gyakori volt a reggeli köd, és harmatképződés. A megyében helyenként alakult ki zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem hullott. A dekád középhőmérséklete az átlag alatt, míg a csapadékösszeg az átlag fölött alakult.

Fenológiai állapotok (09.15. - 09.30.):

Őszi kalászosok: magágy készítés - vetés

Napraforgó: betakarítás

Kukorica: betakarítás

Őszi káposztarepce: szikleveles állapot – 4 leveles állapot

Lucerna: kaszálás

Magról vetett hagyma: betakarítás vége

Cukorrépa: betakarítás

Burgonya: betakarítás

Szőlő: szüretelés

Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

Károsító-helyzet:

Őszi kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tritikálé, stb.): A legtöbb termelő kihasználva a dekád száraz, napos időjárását elkezdte az őszi kalászosok magágy készítését. A dekád végére a vetési munkálatok is elkezdődtek. A őszi gabonafélék vetésforgóba illesztésekor figyelembe kell venni a helyes növényi sorrend betartását, a jelentős kórokozó és kártevők felszaporodásnak elkerülése érdekében. Azokon a helyeken ahol gabonafutrinka (*Zabrus tenebrioides*) kártétele jelentkezett az idei években, kerülni kell a kalászosok visszakerülését. A megelőzés érdekében javasolt a fungicides, és inszekticides vetőmagcsávázás is.

Kukorica: Az állományok betakarítása megkezdődött, és javában tart még.

Napraforgó: A napraforgó betakarítás szinte mindenhol befejeződött. A dekád közepén megérkező nagyobb mennyiségű csapadék nem tett jót a lábon maradó állományoknak. Ezek a táblák nagyobb nedvességtartalommal kerültek betakarításra, a tételek szárítása folyamatos. A napraforgó tarlók tarlóhántását kezdték a termelők.

Őszi káposztarepce: A repce fejlődésének kedvező időjárás hatására az állományok szépen sorolnak, növekednek. A táblákban helyenként megkezdődtek a kémiai védekezések. Az állati kártevők közül a földibolha (*Phyllotreta* spp.) populációk szívogatása okoz gondot, valamint a táblákban fokozott az ősszel csírázó kora tavaszi áttelelő egyéves gyomnövények (T1 életformájú gyomok) kelése, mint pl.: Tyúkhúr – *Stellaria media*, Árvacsalán fajok – *Lamium* spp., Ragadós galaj – *Galium aparine*, Pipitér fajok – *Anthemis* spp. stb., valamint az évelő gyomnövények (G3) között a Mezei acat – *Cirsium arvense* tölevélrózsái is jelentős mennyiségben megtalálhatók. Mindezek mellett elég sok táblán komoly gondot okoz az őszi búza (*Triticum aestivum*) árvakelése is.


Lucerna: A dekád vége felé megkezdődött a lucerna táblák kaszálása.

Burgonya: A burgonya állományok betakarítása megkezdődött fajtától függően.

Szőlő: Szőlőben a szüreti munkálatok továbbra is tartanak. A termés minősége és mennyisége megfelelő.

Szolnok, 2017.10.02.




Balázné Vajda Éva Edina
osztályvezető